

SCHÉMA DE TRAITEMENT AUX JOURS 0 ET 9 AVEC UN PRODUIT DE LA CATÉGORIE « 2 APPLICATIONS »

DATE : _____

NOM DE L'ENFANT : _____

Infestation active adulte nymphe				<p>Faire l'examen visuel des cheveux (mouillés).</p> <p>Enlever poux et lentes avec un bon peigne fin.</p>																												
# Poux 																																<ul style="list-style-type: none"> • Une infestation active est confirmée par la présence d'au moins un pou vivant (stade de nymphe ou adulte). • Vérifier le succès (absence d'infestation active) ou l'échec (infestation active) du traitement le 17^e jour après le début de celui-ci. • En cas d'échec, vérifier les causes probables, apporter les correctifs appropriés, s'il y a lieu, et consulter un professionnel de la santé.
# Lentes 																																
-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	...	
Jour du traitement																																

Légende : 1a : Première application + peigne fin. 2a : Deuxième application + peigne fin.

Procédures pour l'application des produits de la catégorie « 2 applications »

DIMETHICONE 100 CST, 50 % P/P (NYDA[®])

- Appliquer le produit sur des **cheveux secs** (entre 10 et 34 ml, en fonction de la longueur des cheveux). Masser pour bien enrober les cheveux de produit, surtout près de la nuque et derrière les oreilles. Les cheveux doivent être complètement mouillés par le produit.
- Attendre **30 minutes**.
- Passer la chevelure au peigne fin après le traitement pour enlever les poux visibles et les lentes.
- **Laisser le produit sécher sur les cheveux pendant au moins 8 heures (par exemple : toute la nuit)**.
- Laver les cheveux avec un shampoing ordinaire.
- Sécher les cheveux avec une autre serviette ou au séchoir. Déposer les serviettes avec les articles à nettoyer.
- Utiliser le peigne fin pour enlever les poux et les lentes aux jours 2, 11 et 17 après le début du traitement.
- Répéter l'application du produit au jour 9 après le début du traitement.

PERMETHRINE 1 % (Kwellada-P[®] et Nix[®])

- Laver les cheveux avec un shampoing ordinaire **ne contenant pas de revitalisant**. Rincer les cheveux à l'eau tiède et bien les éponger avec une serviette.
- Bien agiter le flacon du produit contre les poux.
- Appliquer de 25 à 50 ml du produit sur le cuir chevelu (jusqu'à 100 ml si les cheveux sont longs). Masser pour bien enrober les cheveux de produit, surtout près de la nuque et derrière les oreilles.
- Laisser agir **pendant 10 minutes**.
- **Rincer à fond** à l'eau tiède.
- Passer la chevelure au peigne fin après le traitement pour enlever les poux visibles et les lentes.
- Sécher les cheveux avec une autre serviette ou au séchoir. Déposer les serviettes avec les articles à nettoyer.
- Utiliser le peigne fin pour enlever les poux et les lentes aux jours 2, 11 et 17 après le début du traitement.
- Répéter l'application du produit au jour 9.
- **Pour permettre une meilleure efficacité du traitement :**
 - ne pas utiliser un shampoing 2 en 1 ni un revitalisant avant et après l'application du produit,
 - ne pas laver les cheveux durant 48 heures après l'application du produit,
 - ne pas utiliser de produit à base de vinaigre.

PYRETHRINES ET BUTOXYDE DE PIPERONYLE (R et C[®], Pronto[®])

- Appliquer de 25 à 50 ml du produit **sur les cheveux secs** (jusqu'à 100 ml si les cheveux sont longs). Masser pour bien enrober les cheveux de produit, surtout près de la nuque et derrière les oreilles.
- Laisser agir **pendant 10 minutes** (sans diluer).
- Ajouter de l'eau en petite quantité jusqu'à la formation de mousse.
- **Rincer à fond** à l'eau tiède.
- Passer la chevelure au peigne fin après le traitement pour enlever les poux visibles et les lentes.
- Sécher les cheveux avec une serviette ou au séchoir. Déposer la serviette avec les articles à nettoyer.
- Utiliser le peigne fin pour enlever les poux et les lentes aux jours 2, 11 et 17 après le début du traitement.
- Répéter l'application au jour 9 après le début du traitement.

SCHEMA DE TRAITEMENT AUX JOURS 0, 7 ET 14 AVEC UN PRODUIT DE LA CATEGORIE « 3 APPLICATIONS »

DATE : _____

NOM DE L'ENFANT : _____

Infestation active adulte nymphe	 	 	 	Faire l'examen visuel des cheveux (mouillés). Enlever poux et lentes avec un bon peigne fin.																											
# Poux 																		<ul style="list-style-type: none"> Une infestation active est confirmée par la présence d'au moins un pou vivant (stade de nymphe ou adulte). Vérifier le succès (absence d'infestation active) ou l'échec (infestation active) du traitement le 17^e jour. En cas d'échec, vérifier les causes probables, apporter les correctifs appropriés s'il y a lieu et consulter un professionnel de la santé. 													
# Lentes 																															
-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	...
Jour du traitement																															

Légende : **1a** : Première application + peigne fin. **2a** : Deuxième application + peigne fin. **3a** : Troisième application + peigne fin.

Procédures pour l'application des produits de la catégorie « 3 applications »

HUILES D'ANIS ETOILE ET DE NOIX DE COCO FRACTIONNEE, HUILE ESSENTIELLE DE CANANGA ODORATA (YLANG-YLANG) ET ALCOOL ISOPROPYLIQUE (ZAP®)
<ul style="list-style-type: none"> Vaporiser le produit sur les cheveux secs jusqu'à ce qu'ils soient légèrement humides. Faire attention de ne pas vaporiser dans les yeux, le nez ou la bouche. Masser pour bien enrober les cheveux de produit, surtout près de la nuque et derrière les oreilles. Laisser agir pendant au moins 15 minutes. Laver les cheveux avec le shampoing habituel. L'usage d'un revitalisant immédiatement après l'application du produit ne sera peut-être pas nécessaire. Passer la chevelure au peigne fin après le traitement pour enlever les poux visibles et les lentes. Sécher les cheveux avec une autre serviette ou au séchoir. Déposer les serviettes avec les articles à nettoyer. Utiliser le peigne fin pour enlever les poux et les lentes aux jours 2, 11 et 17 après le début du traitement. Répéter l'application au jour 7 et au jour 14 après le début du traitement.

MYRISTATE D'ISOPROPYLE ET ST-CYCLOMÉTHICONE (RESULTZ®)
<ul style="list-style-type: none"> Appliquer le produit sur les cheveux secs (de 30 à 120 ml, en fonction de la longueur des cheveux) et masser pour bien enrober les cheveux de produit, surtout près de la nuque et derrière les oreilles. Laisser agir pendant au moins 10 minutes. Rincer les cheveux à l'eau tiède et laver les cheveux avec le shampoing habituel, si désiré. La texture particulière de la chevelure après l'application du produit peut persister après le rinçage elle facilite le passage du peigne. Passer la chevelure au peigne fin après le traitement pour enlever les poux visibles et les lentes. Sécher les cheveux avec une autre serviette ou au séchoir. Déposer les serviettes avec les articles à nettoyer. Utiliser le peigne fin pour enlever les poux et les lentes aux jours 2, 11 et 17 après le début du traitement. Répéter l'application au jour 7 et au jour 14 après le début du traitement.