

Utilisation optimale des EPI (équipement de protection individuelle) en première ligne

*Sujet à modification selon évolution directives du CINQ

2020-04-02

Phase communautaire		
	Cliniques/GMF	CDÉ
Masques		
Travailleur	Changer aux 4 heures ou si souillé	Changer aux 4 heures ou si souillé
Patient	oui	oui
Blouses		
Travailleur	non	Changer si souillée
Patient	non	non
Gants		
Travailleur	Lavage des mains	Changer à Chaque patient
Patient	Solution hydro-alcoolisée / Lavage	Solution hydro-alcoolisée / Lavage
Lunettes		
Travailleur	non	Désinfection chaque jour ou si souillé
Patient	non	non

2020-04-02

Phase NON communautaire		
	Cliniques/GMF	CDÉ
Masques		
Travailleur	non	Changer aux 4 heures ou si souillé
Patient	non	oui
Blouses		
Travailleur	non	Changer si souillée
Patient	non	non
Gants		
Travailleur	Lavage des mains	Changer à Chaque patient
Patient	Solution hydro-alcoolisée / Lavage	Solution hydro-alcoolisée / Lavage
Lunettes		
Travailleur	non	Désinfection chaque jour ou si souillé
Patient	non	non

Légende CDÉ = cliniques désignées d'évaluation

Cliniques/GMF correspondent aux cliniques froides