

MDI-1 - THROMBOPHLÉBITE POUR LES USAGERS DE LA CLINIQUE AOC	N° : X2-0320-PM-050 <i>Révisé : août 2021</i> <i>Résolution : 2021-0222</i>
Référence à une ordonnance : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	

PROFESSIONNELS HABILITÉS ET SECTEURS D'ACTIVITÉS VISÉS PAR LE PROTOCOLE

Professionnels

- Infirmières travaillant à l'accueil et orientation clinique

Secteurs d'activités

- Accueil et orientation clinique (AOC)

GROUPE DE PERSONNES VISÉES OU SITUATION CLINIQUE VISÉE

- Pour tous les usagers admissibles à l'accueil et orientation clinique demandant une investigation en médecine interne pour une thrombophlébite. Classer subaiguë A.

INDICATIONS

- À l'accueil et orientation clinique, faire les examens selon le type d'investigation déterminé par le médecin requérant.

CONDITIONS

- Aucun

CONTRE-INDICATIONS

Si depuis la réception de la demande de référence médicale:

- Température buccale supérieure ou égale à 38,5 °C;
- Dyspnée;
- Tirage;
- FC supérieure ou égale à 100/min;
- RR supérieur ou égal à 22/min;
- Saturation inférieure ou égale à 92 %;
- Douleur thoracique subite;
- Douleur thoracique augmentée à l'inspiration.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES / SURVEILLANCE

Préparation précédant la consultation, le médecin référent doit s'assurer :

- Que l'utilisateur n'a pas de contre-indications à l'anticoagulation;
- De remettre à l'utilisateur, selon leur évaluation des risques, une ordonnance pharmaceutique d'anticoagulant que l'utilisateur débutera d'emblée si Doppler non fait dans les 24 heures comme prévu au protocole.

LIMITES ET RÉFÉRENCE

Aucune

MDI-1 - THROMBOPHLÉBITE POUR LES USAGERS DE LA CLINIQUE AOC	N° : X2-0320-PM-050
Adopté le : 2021-09-15	Page 1 sur 2

MDI-1 THROMBOPHLÉBITE

DOPPLER VEINEUX

Délai inférieur ou égal à 24 heures

- Si négatif;
- Si douteux;
- si thrombophlébite superficielle non extensive **ET** pas de cancer, thrombophilie connue, antécédent de thrombophlébite profonde, prise d'estrogène.

Épreuves sanguines

Hématologie :

- FSC;
- INR;

Biochimie :

- Créatinine;
- Électrolytes;
- ALT;
- BHCg si indiqué.

Si thrombophlébite superficielle

Si thrombophlébite profonde

Si anticoagulant prescrit par le médecin référent pour suspicion de thrombophlébite profonde, cesser l'anticoagulant.

Délai de 24 heures

- Extensive : Plus de 5 cm de longueur ou s'approchant à moins de 3 cm de la crosse de la saphène;
OU
- Chez les usagers souffrant des affections suivantes:
 - Cancer, thrombophilie connue, antécédent de thrombophlébite profonde, prise d'estrogène.

Aviser :
Médecine interne le même jour

Délai de 24 heures

Aviser :
Médecine interne le même jour

Consultation et ordonnances
Médecine interne à l'AOC

Délai selon le spécialiste

Consultation et ordonnances
Médecine interne à l'AOC
OU CDJMI

Médecin requérant

Délai de 24 heures

Légende : CDJMI : Centre de jour en médecine interne