Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

Québec


PROTOCOLE MÉDICAL

T NOTOGOLE IVILDI	
CA-1 : ANGINE OU DOULEUR RÉTRO STERNALE ATYPIQUE AVEC FACTEUR DE RISQUE POUR LES USAGERS DE LA CLINIQUE AOC	N°: X2-0320-PM-046 Résolution: 2019-0271
Référence à une ordonnance : □ oui 🛛 non	
PROFESSIONNELS HABILITÉS ET SECTEURS D'ACTIVITÉS VISÉS PAR LE PRO	TOCOLE
Professionnels Infirmière travaillant à l'accueil et orientation clinique (AOC) Secteurs d'activités Accueil et orientation clinique	
GROUPE DE PERSONNES VISÉES OU SITUATION CLINIQUE VISÉE	
Tous les usagers admissibles à l'accueil et orientation clinique demandar pour angine ou douleur rétro sternale atypique avec facteurs de risques. ou une femme de 50 ans et plus.	_
INDICATIONS	
 Investigation spécifique. 	
CONDITIONS	
Aucune	
CONTRE-INDICATIONS	
Si, depuis la réception de la référence médicale : Douleur thoracique non soulagée par la prise de nitro sublingual à 3 repr douleur; Douleur thoracique plus de 30 minutes; Si	ises pour un même épisode de l'usager est déjà suivi par un diologue, le référer à celui-ci.
Préparation précédent la consultation :	
 Si aucune allergie à l'AAS ou à l'AINS et aucun saignement actif lors de la 	conversation téléphonique avec
l'usager : ○ S'assurer de la prise d'AAS à 80 mg ou 325 mg die jusqu'à la cons	ultation en cardiologie.
Aucune	
RÉFÉRENCES	
Aucun	

CA-1 : ANGINE OU DOULEUR RÉTRO STERNALE ATYPIQUE AVEC FACTEURS DE RISQUE POUR LES USAGERS DE LA CLINIQUE AOC	N° : X2-0320-PM-046
Adopté le : 2019-10-23	Page 1 sur 2

DIRECTIVES / PROCÉDURE

À l'accueil et orientation clinique, faire les examens selon le type d'investigation déterminé par le médecin requérant.



CA-1 : ANGINE OU DOULEUR RÉTRO STERNALE ATYPIQUE AVEC FACTEURS DE RISQUE POUR LES USAGERS DE LA CLINIQUE AOC	N° : X2-0320-PM-046
Adopté le : 2019-10-23	Page 2 sur 2